



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

DLP ■ 10-7-08019849

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 23 du 8 juillet 2008 - 1 page

Actualité

STADES

TOURNESOL : bouton étoilé à début floraison.
MAIS : 8-12 feuilles à sortie des panicules.

Actualité

Pyrale du maïs

Les captures sont en légère hausse par rapport à la semaine précédente. Peu de pontes sont encore observées (signalements à Poigny-77 et Hériveau-95).

La baisse des températures va allonger la durée d'incubation des pontes déjà déposées.

Dans les situations non protégées par des trichogrammes, le choix d'une intervention ou non doit se raisonner selon le risque :

- *réel* = au moins 10% des pieds présentant des pontes (observation face inférieure des feuilles médianes)

- *théorique* = importance des attaques de l'an passé dans l'environnement, broyage ou non des résidus.

L'intervention doit être positionnée juste avant les premières éclosions.

Pucerons

Pucerons du maïs

Les niveaux d'infestation ont régressé assez nettement, avec une activité croissante des auxiliaires. On est revenu à des populations de 10-50 pucerons / plante, avec encore quelques situations présentant une centaine de pucerons par pied.

A surveiller les éventuelles attaques de Rhopalosiphum padi sur panicules, surtout après les interventions chimiques contre la pyrale.

En bref

Féverole

Présence plus ou moins forte de pucerons verts. La rouille commence à évoluer dans les témoins.

Maladies betteraves

Le contexte maladie classique de la région (apparition oïdium courant juillet puis des autres maladies plus tard) a été différent ces deux dernières années avec des attaques plus précoces et plus fortes de cercosporiose et de rouille, ainsi que de ramulariose en 2007.

Cela démontre la nécessité que la lutte contre les maladies soit basée sur des observations réelles, et non systématique :

- un traitement trop précoce risque peut amener à manquer de persistance en fin de cycle, ou à devoir réaliser une 3ème intervention,
- un démarrage trop tardif rend plus difficile la maîtrise des maladies.

Le réseau de parcelles mis en place par l'ITB, le SPV, la Fredon, les sucreries de Nangis et Soudes, les Chambres d'Agriculture et le GRCETA permet de surveiller l'apparition et le développement des maladies.

Aucun symptôme n'a été détecté pour le moment dans la région. La région Centre signale par contre quelques symptômes de ramulariose, rouille et cercosporiose. A suivre.

Seuils de déclenchement pour le T1 :

- pour l'oïdium : 15% de feuilles atteintes
- pour la rouille : 15%
- pour la cercosporiose : 5%
- pour la ramulariose : 5%

Ravageurs betteraves

Les attaques de noctuelles et teignes restent encore limitées.



Direction Régionale et
Interdépartementale de
l'Agriculture et de la
Forêt
Service Régional de la
Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE


10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Ile de France

Imprimé à la station
D'Alertes
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
N. THERRE

Publication périodique
C.P.A.P.
n°0909 B 07113
ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2008:
87 euros (papier)
76 euros (fax)
68 euros (mail)



D3 5.20 18754

P193